

Памятка: главное о постинъекционной саркоме у кошек

Из курса Учебника Т—Ж «Как жить с кошкой»

Постинъекционная саркома у кошек — это агрессивная злокачественная опухоль, которая может возникнуть в местах введения вакцин, лекарств или чипов


Вот как снизить риск возникновения постинъекционной саркомы:

1. Составьте индивидуальный график вакцинации с ветеринарным врачом, чтобы кот не получал ненужных инъекций
2. Выбирайте эффективные вакцины без адъюванта, если они доступны
3. Просите ветеринара вводить вакцины подкожно, в голень пониже или в дальнюю часть хвоста. В голень вакцинировать проще.
[Наглядную схему вы найдете на второй странице памятки](#)
4. Записывайте, куда именно ввели вакцину, и меняйте места вакцинации
5. Регулярно ощупывайте питомца, чтобы вовремя заметить, если на его теле возникнет какое-то уплотнение
6. Если шишка на месте инъекции не проходит в течение трех недель, свяжитесь с врачом. Обязательно сделайте биопсию, если уплотнение:
 - Не пропадает спустя три месяца после инъекции
 - Превышает 2 см в диаметре
 - Увеличивается в размере спустя месяц после инъекции

Подходящие и неподходящие места для инъекций

❌ Сюда
не рекомендовано
ставить вакцину

✅ Сюда
рекомендовано
ставить вакцину



Памятка составлена по материалам [Международной ветеринарной ассоциации мелких домашних животных](#), [Европейского консультативного совета по вопросам заболеваний кошек](#) и [Американской ассоциации больниц для животных](#)

