



Памятка: график и схема вакцинации домашних котят и кошек

Из курса Учебника Т—Ж «Как жить с кошкой»

Заболевание	Вакцинация котят ≤ 16 недель	Вакцинация кошек > 16 недель	Ревакцинация
Панлейкопения, герпес-вирус, калицивироз	Первая вакцина с 6 недель, далее каждые 3—4 недели до достижения 16 недель	Две дозы с интервалом 2—4 недели	<ul style="list-style-type: none">• В 6 месяцев• В дальнейшем — по согласованию с врачом Кошки в группе низкого риска — в возрасте 3 лет и далее раз в 3 года. Кошки в группе высокого риска — вплоть до раза в год
Бешенство	В соответствии с законом, по инструкции к вакцине: чаще всего однократно с 12 недель	В соответствии с законом, по инструкции к вакцине	Ежегодно
Вирус лейкоза кошек	Первая доза с 8 недель, вторая — через 3—4 недели	Две дозы с интервалом 3—4 недели	Через год после введения второй дозы. Если кот входит в группу риска — ежегодно

В домах, где содержится несколько кошек, на передержках и в приютах животных вакцинируют [по другой схеме](#) из-за повышенного риска распространения болезней

Нормальная реакция после прививки:

- Легкая вялость
- Снижение аппетита
- Однократная рвота
- Небольшое повышение температуры
- Болезненность и отек в месте укола

Симптомы обычно проходят самостоятельно. Заранее обсудите с врачом, за какой срок они должны пройти

⚠ Оставайтесь в клинике 30—60 минут после вакцинации и позовите ветеринара, если у кота есть признаки анафилактического шока:

- Выраженная вялость, предобморочное состояние
- Затрудненное дыхание
- Опухание или покраснение мордочки

⚠ Сделайте биопсию, если вы обнаружили на месте укола уплотнение, которое соответствует хотя бы одному из признаков:

- Не проходит в течение трех месяцев после прививки
- Больше 2 см в диаметре
- Продолжает увеличиваться через месяц после укола

